



べにもり五寸 ニンジン

～ 吸い込み性が抜群で、しなびも遅い ～


『べにもり』の吸い込み性の強さについて

ニンジンには品種によって吸い込み性の強いものと弱いものがあります。吸い込み性が弱いと抽根（地上に根部が抜けあがること）してしまいます。抜け上がった首部に光が当たると、肌が赤色や緑色に変色してしまい、商品価値に影響が出ます。


実際の栽培で夏蒔き・秋冬どりの作型では、除草も兼ねて中耕・土寄せを行い、青首を防止しますが、吸い込み性が強い品種のほうがより有利です。

年越しをして収穫する場合、抽根しやすい品種では地上に露出した肌が光を受けて青首となったり、寒さを受けてひび割れを生じたりすることがあります。

『べにもり』は吸い込み性が抜群ですので、青首や肩のひび割れが極めて少ない品種です。



■ 首部の変化の比較と抽根の様子



播種：2006年7月31日
撮影：2007年1月24日
※ 土寄せなし

- 左上：『べにもり』と他社 Y 種の首部変色の比較
- 左下：抽根しない『べにもり』
- 右下：抽根している他社 Y 種



味と色にこだわった逸品『べにもり』の特性

- 芯が細めで、根色・芯色ともに着色がよい。
- 甘味が強く、食味に優れている。
- 根形はやや長めの円筒形。生育は中生で、吸い込み性が強く、耐寒性に優れ、青首の発生が極めて少ない。
- 2月～3月の遅どりででもヒゲ根の発生が少なく、肌が非常に滑らか。



年内～越冬どりまで
長期間収穫可能な
『べにもり』を
ぜひお使い下さい。

■ しなびが遅い『べにもり』



播種：2005年8月10日 撮影：2006年4月7日
株間：8cm

しなびの遅い『べにもり』は、
長期間にわたって高品質です。